

## Informovaný súhlas pacienta s aplikáciou všeobecného výplňového materiálu

- Bol(a) som dostatočne informovaný(á) o použití, indikáciách, kontraindikáciách a možných nežiadúcich účinkoch výplňových materiálov
- Otvorene a pravdivo som zodpovedal(a) všetky otázky týkajúce sa môjho zdravotného stavu a taktiež som svojho ošetrojúceho lekára informoval(a) o všetkých predchádzajúcich esteticko - chirurgických zákrokoch v mieste dnešnej aplikácie.
- Bolo mi umožnené položiť všetky otázky ohľadne ošetrovania, ktoré ma zaujímali a dostal(a) som dostatočne uspokojivé odpovede.

Beriem na vedomie, že:

- **Všeobecný výplňový materiál** obsahuje sterilný, viskózne-elastický gél, ktorý nie je živočíšneho pôvodu. Základom týchto produktov je zosieťovaná kyselina hyalurónová určená na úpravu vrások a záhybov na tvári, na modeláciu lícnych kostí a úpravu kontúr tváre a taktiež na úpravu kontúr a zväčšenie objemu pier. Aplikujú sa priamo do dermy.
- Produkty , ktoré obsahujú zosieťovanú kyselinu hyalurónovú **účinkujú v priemere 6 - 12 mesiacov. Priemerná dĺžka účinku je ovplyvnená niekoľkými faktormi:** typ pokožky pacienta, rozsah požadovanej korekcie, spôsob aplikácie a injektované množstvo.
- Základom produktu je nezosieťovaná kyselina hyalurónová. Používa sa na rehydratáciu pokožky.

Bol(a) som informovaný(á), že po aplikácii produktu

- Môže vzniknúť začervenanie pleti, opuch, svrbenie a/alebo mierna bolesť v mieste vpichu, avšak tieto príznaky postupne ustúpia do 3 dní.
- V mieste vpichu môže tkanivo stvrdnúť, alebo sa môže vytvoriť uzlík.
- V ojedinelých prípadoch bola pozorovaná zmena sfarbenia pleti v mieste vpichu.

Počas týždňa pred aplikáciou výplňového materiálu sa neodporúča užívať vysoké dávky aspirínu, Vitamínu E a lieky proti zápalom a bolesti, ako aj lieky proti zrážanlivosti krvi. Počas 2 týždňov po aplikácii by ste sa mali vyhýbať extrémnym teplotám (vysoký chlad, sauny, UV a slnečné žiarenie).

- Okrem toho som bol(a) informovaný(á), že, v zriedkavých prípadoch boli v odbornej literatúre opísané tieto nežiadúce účinky po aplikácii kyseliny hyalurónovej: nekróza v glabelárnej oblasti (medzi obočím), granu - lómy, abscesy a alergické reakcie.
- O všetkých nežiadúcich účinkoch pretrvávajúcich dlhšie ako 1 týždeň musí pacient informovať svojho ošetrojúceho lekára, ktorý následne zahájí potrebnú terapiu. Táto terapia môže v extrémnych prípadoch trvať niekoľko mesiacov.
- Bola som oboznámená s odporúčaniami po aplikácii a zavazujem sa ich dodržiavať.

Uvedené skutočnosti a vysvetlenia som pochopil(a) a po dôkladnom zvážení požadujem aplikáciu výplňového materiálu.

\_\_\_\_\_  
Meno pacienta (tlačeným písmom)

\_\_\_\_\_  
Meno lekára

\_\_\_\_\_  
Dátum a podpis pacienta

\_\_\_\_\_  
Dátum, podpis a pečiatka lekára